

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

# diosmectal®

3 g polvere per soluzione orale in bustine

## diosmectite

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Assuma sempre il medicinale come descritto in questo foglio illustrativo o secondo quanto indicato dal suo medico, o farmacista.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha bisogno di ulteriori informazioni o consigli, si rivolga al suo farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perchè potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere il paragrafo 4.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è DIOSMECTAL e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare DIOSMECTAL
3. Come prendere DIOSMECTAL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DIOSMECTAL
6. Contenuto della confezione ed altre informazioni

### 1. CHE COS'È DIOSMECTAL E A COSA SERVE

Diosmectal è una argilla naturale purificata e standardizzata.

DIOSMECTAL copre la mucosa e la protegge aumentando la resistenza del muco e legandosi a patogeni, batteri, virus e tossine.

DIOSMECTAL è utilizzato per il trattamento:

- Del dolore associato a patologie funzionali intestinali negli adulti
- Della diarrea acuta nei bambini, di età superiore a 2 anni, in aggiunta ai trattamenti orali con soluzioni reidratanti saline e negli adulti.
- Della diarrea cronica (diarrea a lungo termine) negli adulti

Si rivolga al medico se non si sente meglio o si sente peggio. L'utilizzo prolungato o ripetuto di DIOSMECTAL non è raccomandato in assenza di un parere medico.

### 2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE DIOSMECTAL

**Non usare DIOSMECTAL**

Se è allergico al principio attivo (diosmectite) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere DIOSMECTAL. Il medico raccomanderà per i pazienti fragili e per i bambini l'assunzione di soluzioni idratanti per evitare la disidratazione e se necessario prescriverà la somministrazione di liquidi e sali in vena.

- Informi il medico se ha avuto in passato casi di stipsi severa.
- Nella diarrea acuta l'uso prolungato di DIOSMECTAL deve essere evitato.

Si rivolga al suo medico:

- se il dolore è associato a elevata temperatura o vomito

**Regole dietetiche supplementari:**

- Assicurarsi una reidratazione ricca di bevande dolci e salate, per compensare la perdita di fluidi dovuta alla diarrea (il fabbisogno medio giornaliero di acqua nell'adulto è di 2 litri)
- Mantenere l'assunzione di cibo mentre la diarrea persiste, escludendo però alcuni cibi o bevande ghiacciate.
- Preferire carne grigliata o riso

**Altri medicinali e DIOSMECTAL**

Le proprietà assorbenti di questo prodotto possono interferire con l'assorbimento di altre sostanze. Pertanto, non devono essere assunti altri farmaci contemporaneamente con diosmectite. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale.

**Fertilità, gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

L'uso di Diosmectal non è raccomandato durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno.

Il medico prescriverà Diosmectal solo in caso di effettiva necessità.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non esistono studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia non è previsto alcun effetto.

**DIOSMECTAL contiene glucosio e saccarosio.** Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

**DIOSMECTAL contiene etanolo**

Questo medicinale contiene 0,3 mg di alcol (etanolo) in ogni dose. La quantità, in dose di questo medicinale, è equivalente a meno di 0,0075 ml di birra o 0,003 ml di vino.

La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

### 3. COME PRENDERE DIOSMECTAL

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

**Trattamento di diarrea acuta**

**Posologia**

**Adulti:**

la dose raccomandata è di 9 g al giorno, pari a 3 bustine al giorno. La dose giornaliera può essere raddoppiata all'inizio del trattamento.

**Bambini di età superiore a 2 anni:**

la dose raccomandata è di 6 g al giorno, pari a 2 bustine al giorno. Il dosaggio può essere raddoppiato all'inizio dell'episodio di diarrea acuta.

DIOSMECTAL non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

**Durata di trattamento**

Non superare i 7 giorni di trattamento.

**Trattamento di diarrea acuta**

**Posologia**

**Adulti**

La dose media raccomandata è di 9 g al giorno, pari a 3 bustine al giorno.

## Modalità e via di somministrazione

Uso orale

Il contenuto della bustina deve essere miscelato in sospensione poco prima dell'uso.

Adulti: il contenuto della bustina può essere miscelato in mezzo bicchiere d'acqua.

Bambini: Il contenuto della bustina può essere miscelato in sospensione in una bottiglia da 50 ml di acqua da somministrare ad intervalli nel corso della giornata, o miscelato con un alimento semiliquido, come il brodo, composta, purè, alimenti per l'infanzia.

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o secondo le indicazioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### **Se prende più DIOSMECTAL di quanto deve**

L'assunzione eccessiva di Diosmectal può causare costipazione. La costipazione in genere scompare quando il trattamento viene sospeso o la dose viene ridotta.

### **Se dimentica di prendere DIOSMECTAL**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestano.

Gli effetti indesiderati riportati sono generalmente lievi e transitori e includono:

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 10)  
Costipazione

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 10)  
Rash

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 paziente su 1000)  
Orticaria (rash pruriginoso)

Effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Sintomi di reazione allergica come arrossamento della pelle, prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie, sensazione di svenimento o collasso.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/conten-t/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. COME CONSERVARE DIOSMECTAL**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene DIOSMECTAL**

*Principio attivo:* diosmectite 3 g

*Altri componenti:* saccarina sodica, glucosio monoidrato, aroma vaniglia\*, aroma arancio\*\*.

\*composizione dell'aroma vaniglia: maltodestrina, saccarosio, gliceril triacetato (E1518), biossido di silicio (E551), alcool etilico, lecitina di soia (E322), aromatizzanti vaniglia

\*\*composizione dell'aroma arancio: maltodestrina, saccarosio, gomma arabica (E414), esteri mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi di acidi grassi (E472e), biossido di silicio (E551), aromatizzanti arancio

### **Descrizione dell'aspetto di DIOSMECTAL e contenuto della confezione**

Polvere per sospensione orale in bustine.

DIOSMECTAL è disponibile in differenti confezioni contenenti:

- 30 bustine

- 20 bustine

- 10 bustine

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **Titolare dell'A.I.C. nel Paese d'origine:**

IPSEN Consumer HealthCare,  
65 quai George Gorse – 92100 Bolougne – Billancourt, Francia

### **Produttore**

Beaufour - Ipsen Industrie  
Rue d'Ethe Virton - Dreux (Francia)

### **Importatore e Titolare AIP:**

GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)

### **Riconfezionato nell'officina indicata con l'ultima lettera accanto al numero di lotto:**

ⓑ XPO SUPPLY CHAIN Pharma ITALY SpA - via Amendola, 1 20090 Caleppio di Settala (MI)

Ⓒ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato ad Aprile 2021**