

# NETTACIN® COLLIRIO 0,3%

Collirio, soluzione

Netilmicina

## Composizione

### Collirio multidose

100 ml contengono:

**Principio attivo:** Netilmicina solfato g 0,455 pari a Netilmicina g 0,300

**Eccipienti:** Sodio cloruro - Benzalconio cloruro - Acqua purificata

### Collirio monodose

100 ml contengono:

**Principio attivo:** Netilmicina solfato g 0,455 pari a Netilmicina g 0,300

**Eccipienti:** Sodio cloruro - Acqua purificata

## Forma farmaceutica e contenuto

Collirio, soluzione in flacone da 5 ml

Collirio, soluzione 15 contenitori monodose da 0,3 ml

Collirio, soluzione 20 contenitori monodose da 0,3 ml

## Categoria farmacoterapeutica

La Netilmicina è un antibiotico aminoglicosidico.

## Titolare A.I.C.

S.I.F.I. S.p.A. - Sede legale: via Ercole Patti, 36 - 95020 Laviniaio - Aci S. Antonio (CT)

## Concessionario di vendita

EYELAB S.R.L. - Via Ercole Patti, 36 - 95025 Aci S. Antonio (CT)

## Produttore

S.I.F.I. S.p.A. - Officina di Aci S. Antonio (CT)

## Importatore e Titolare AIP:

GMM Farma S.r.l. - via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)

## Riconfezionato nell'officina indicata con l'ultima lettera accanto al numero di lotto:

Ⓛ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)

Ⓢ Pb beltracchini s.r.l. - via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI)

## Indicazioni terapeutiche

Trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla Netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.

## Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto o verso altri aminoglicosidi.

## Precauzioni d'impiego

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Nella primissima infanzia e in gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo medico. Si sconsiglia l'assunzione durante l'allattamento. Il NETTACIN COLLIRIO non è iniettabile; pertanto non va iniettato per via sottocongiuntivale o introdotto in camera anteriore.

## Interazioni farmacologiche

Non sono state segnalate significative interazioni farmacologiche con l'uso della Netilmicina in collirio.

La contemporanea somministrazione anche topica, specie se intracavitaria, di altri antibiotici potenzialmente nefrotossici ed ototossici può accrescere il rischio di tali effetti. E' stato riferito un aumento della nefrotossicità potenziale di alcuni aminoglicosidi a seguito della somministrazione susseguente o contemporanea, che dovrebbe essere evitata, di altre sostanze potenzialmente nefrotossiche, quali cisplatino, polimixina B, colistina, viomicina,

streptomina, vancomicina, altri aminoglicosidi ed alcune cefalosporine (cefaloridina) o di diuretici potenti quali l'acido etacrinico e la furosemide, per le ripercussioni sul rene.

In vitro l'associazione di un aminoglicoside con un antibiotico betalattamico (penicilline o cefalosporine) può causare una reciproca e significativa inattivazione. Anche quando un antibiotico aminoglicosidico ed uno penicillino-simile sono stati somministrati attraverso due vie differenti, si è verificata una riduzione dell'emivita o dei livelli plasmatici dell'aminoglicoside in pazienti con insufficienza renale ed in alcuni pazienti con funzionalità renale normale.

### Avvertenze speciali

L'uso prolungato di antibiotici topici può condurre alla crescita di microrganismi resistenti. Nel caso in cui, dopo un ragionevole periodo di tempo, non si ottenessero miglioramenti del quadro clinico o se si verificassero irritazioni o manifestazioni di ipersensibilità, occorre sospendere il trattamento e ricorrere ad una terapia adeguata.

### Dose, modo e tempo di somministrazione

Instillare nel sacco congiuntivale una o due gocce di collirio 3 volte al dì o secondo prescrizione medica.

Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto.

NETTACIN COLLIRIO monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato.

Evitare che l'estremità del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie.

### Effetti indesiderati

Il NETTACIN COLLIRIO può determinare l'insorgenza di lievi e temporanee irritazioni oculari o fenomeni di ipersensibilità caratterizzati da edema, eruzioni orticarioidi e prurito.

Si chiede ai pazienti, qualora si verificassero effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo, di darne comunicazione al proprio medico o al farmacista.

### Scadenza

Per la data di scadenza si rimanda alla confezione.

**Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.**

Conservare a temperatura inferiore a 25 °C

NETTACIN COLLIRIO in confezione multidose non deve essere usato dopo 28 giorni dalla prima apertura.

NETTACIN COLLIRIO in confezione monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato.


### USO OFTALMICO

#### TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

Data di ultima revisione: Giugno 2015

#### Istruzioni per l'uso

##### Collirio multidose



Avvitare il tappo fino in fondo per perforare il flacone.



Svitare il tappo, capovolgere il flacone ed instillare esercitando una lieve pressione sullo stesso.



Richiudere il flacone avvitando il tappo fino in fondo.

##### Collirio monodose



Staccare la monodose dalla strip.



Aprire ruotando la parte superiore senza tirare.

Informazioni dettagliate e aggiornate per questo prodotto sono disponibili attraverso la scansione del codice QR, riportato sul confezionamento del prodotto, con uno smartphone. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul seguente URL:

<http://qr.sifigroup.com/1g106310/>

Tutti i marchi ed i nomi commerciali di terza parti appartengono ai rispettivi proprietari.